



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๗-๕๕๐๐
ภายใน ๕๙๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๐

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว แนะวิธีตรวจดูซีสต่างมะเร็ง

ASTVผู้จัดการรายวัน - มศว แนะวิธีตรวจดูซีสต้านม แตกต่างจากมะเร็งที่โตขึ้นเรื่อยๆ ไม่เจ็บ ล่านหัสจะโตๆ บุบๆ ตามรอบเดือนและเจ็บ แต่แนะนำให้ตรวจยืนยันจากแพทย์

ผศ.พญ.คลุณี สองพิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต้านม โรงพยาบาลศุภารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องค์กรนี้) เปิดเผยว่า ซีสต้านม คือภาวะถุงน้ำที่เต้านมมีก้อนเมริโนเต้านมแต่หากไม่ได้วินการยืนยันจากแพทย์ ก็อย่าเพิ่งช้าใจไป เพราะอาจไม่ใช่แค่ ซีส อาจจะร้ายแรงถึงขั้นเป็น เนื้องอก หรือมะเร็งได้

"ซีสที่คนส่วนใหญ่รู้จักและพบเห็นมาก คือ ซีส ที่ก่อพัง จนเป็นห้องเล็กๆ ร่องรอยของซีส ที่ไม่สามารถรักษาได้ แต่เมื่อพบซีสที่ไม่ก่อพัง ทำให้มีผิวขาวสุก ผิวขาวสาร มักเกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันที่ก่อพัง ทำให้มีซีสเคลลสมอยู่ภายในถุงซีส ส่วน ซีสต้านม ก็จะก่ออาการที่ก่อพังอยู่ในเนื้อเต้านมเป็นหย่อมๆ ทำให้เวลาตรวจดูจะพบเป็นถุงน้ำ เมื่อไห่มือคลำจากภายนอก จะพบเป็นก้อนในเนื้อนม อาจมีอาการปวดบริเวณเต้านม เนื่องจากน้ำในซีส ดันเนื้อนมรอบข้าง ทำให้เต้านมตึงเกิดอาการปวด เวลาคลำจะพบก้อนที่เต้านมด้วย手ได้ และสามารถพูดได้ในหลายตำแหน่ง ซีส โดยทั่วไปเป็นถุงน้ำ สามารถโดยและบุบจนหายสาบสูญได้"

ผศ.พญ.คลุณี สองพิศ กล่าวอีกว่า ซีสต้านม จะโตๆ บุบๆ ตามรอบเดือนและเจ็บ ผิดกับมะเร็งที่จะโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่เจ็บ ซีส มักจะมี หยุ่นๆ แต่มะเร็งจะมีลักษณะแข็ง การตรวจด้วยอัลตราซาวน์จะทำให้รู้ว่าเป็นซีส หรือเป็นมะเร็ง ส่วนอภิวิธีที่นิยมก็คือการใช้เข็มฉีดยาเจาะถูก หากเป็นซีสจะเจ็บ แต่ก้อนก็จะยุบหายไป หากที่ดีหากตรวจพบก้อนอะไรก็ตามที่เต้านม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคที่แท้จริงจะปลอดภัยมากกว่า ■