



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๕๒,๙๘๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เภสัชฯเตือนอันตรายบดยาเม็ด เรื่องเล็กๆที่อาจเป็นเรื่องใหญ่

เภสัชกรหญิงปภาวี ศรีสุข งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล่าวว่า ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารทางจมูกทำให้ไม่สามารถกินยาเม็ดได้หากผู้ดูแลรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บดเม็ดยาให้ละเอียด ละลายใส่น้ำเพื่อหวังจะให้ผู้ป่วยกินยาได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีการที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งและจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วย เนื่องจากเมื่อรับประทานยาเม็ดเข้าไป ยาเม็ดจะเดินทางไปยังหลอดอาหาร และเกิดการละลายที่กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดที่ลำไส้เล็ก เพื่อไปยังอวัยวะต่างๆ แล้วจึงออกฤทธิ์

แต่เนื่องจากยาเม็ดประเภทต่างๆ ที่ผลิตออกมาไม่ได้มีแค่ยาเม็ดธรรมดาเท่านั้น ยังมียาเม็ดเคลือบชนิดต่างๆ ที่มีจุดประสงค์ในการเคลือบแตกต่างกันออกไป 1.เพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยา ซึ่งยาเม็ดชนิดนี้จะมีปริมาณยาต่อเม็ดมากกว่ายาเม็ดธรรมดาหลายเท่า และค่อยๆปลดปล่อยตัวยาที่ชนิดตลอดทั้งวัน หากบดยา

ชนิดนี้ ปริมาณยาทั้งหมดที่มีก็จะปล่อยออกมาหมดเลย ผู้ป่วยอาจได้รับขนาดยาสูงเกินไปจนเกิดอันตรายได้ยาดังกล่าวมักมีชื่อลงท้ายด้วย MR, SR, XR เช่น ยาเบาหวาน Diamicron MR, Glucophage XR

2.เพื่อป้องกันกรดในกระเพาะอาหารทำลายตัวยา หากบดยาเหล่านี้ เมื่อรับประทานเข้าไปยาจะถูกทำลายตั้งแต่กระเพาะอาหาร และถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็ก น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ยาประเภทดังกล่าวได้แก่ ยาลดกรด Omeprazole 3.ป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ยาประเภทนี้จึงถูกนำมาเคลือบเพื่อให้ยาผ่านกระเพาะอาหารโดยไม่เกิดอาการข้างเคียง เช่น ปวดท้อง แสบท้อง ดังนั้น การบดยาอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงได้ ตัวอย่างยากลุ่มนี้ เช่น แอสไพริน ทั้งนี้ หากการรับประทานยาเม็ดมีปัญหาจริงๆ สิ่งที่ต้องทำคือ แจ้งแพทย์เพื่อให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบยาที่เหมาะสมแทน เช่น เปลี่ยนเป็นยาน้ำหากมีข้อสงสัยสอบถามเภสัชกรประจำโรงพยาบาล