



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนเว็บไซต์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ บนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวัน 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 หน้า 3 ผู้อ่าน 110,543.-

รู้กัน..พร้อมรับมือโรคที่มา กับหน้าฝน

นพ.พลากร ศรีนิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ศูนย์การแพทย์ปัญญาบันทกิจชุ ชลประทาน เผย
ว่า โรคติดต่อที่พบบ่อยในฤดูร้อนและฤดูฝน โรค
ติดเชื้อจากทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่
(influenza) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้
หวัดใหญ่ ที่พบบ่อยคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A,
สายพันธุ์ B และสายพันธุ์ C แต่ที่เป็นสาเหตุใน
คนที่พบบ่อยคือ สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ผู้
ป่วยจะมีอาการที่สำคัญคือ มีไข้สูงรับพลันทันที
ทันใด ไข้สูงลดลงในกว่า 39-40 องศาเซลเซียส
ติดต่อกัน 3-4 วัน ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ จาม คัดจมูก มีน้ำมูก

คุณหมอกล่าวว่า การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป คือ ติดต่อโดยการหายใจเข้า ละของน้ำมูก น้ำลาย และเสmenทางของผู้ป่วยที่ไอ หรือจาม และการลัมมัดมือหรือลิ้งของต่างๆ รวมกับผู้ป่วย โรคมีระยะ潜伏ตัวประมาณ 1-3 วัน ระยะติดต่อผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการ จนถึง 7 วันหลังรับเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการลัม กกล่าวของรายชาวยาใน 1-2 ลัมปดาห์ แต่บางรายมีอาการนานกว่านั้น วิธีแยกอาการไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดา ลักษณะเดียวกันได้คือไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงและเป็นนานกว่าไข้หวัดธรรมดา

สำหรับคนไข้บ้างรายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ ปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือต้อรุนแรงมากอาจทำให้เลือดขอดได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะที่ 2-3 หรือเด็กที่รับประทานยาและเพรินมานะเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่รับประทานยากดกมีมาเป็นระยะเวลาหนาน การรักษาไข้หวัดใหญ่นั้นล้วน



การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคrunny หรือเป็นอันตราย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนฟรีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ร่วมกับการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ลิ้งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

ใหญ่ให้การรักษาตามอาการ เนื่องจากเป็นการติดเชื้อไวรัส แต่มีผู้ป่วยบางรายที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัสสำหรับการให้ยาต้านไวรัสได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มที่อาการค่อนข้างรุนแรง

ส่วนการป้องกันที่สำคัญคือ การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

โรคrunny หรือเป็นอันตราย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนฟรีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ร่วมกับการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ลิ้งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด.