



72
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวัน ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 หน้า 1,2 มูลค่าข่าว 132,098.-

ห่วงสุขภาพบุรีไฟฟ้า เสี่ยงโควิด14เท่า

หวั่นบุรีไฟฟ้าแพร่กระจายเชื้อโควิด-19เพิ่ม

หมอโรคปอดเตือนสุขภาพบุรีไฟฟ้าเสี่ยง
ติดเชื้อโควิดมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 14 เท่า
ระบุสิ่งทอหมักควันสูบบุหรี่โรครุนแรง
ผลภูมิต้านทานต่ำ ติดโควิดอาการ
รุนแรงถึงตายได้ ชี้น้ำบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มแพร่
กระจายโรครุนแรง เหตุปล่อยละออง
เยอะ-แฉะกันสูบ

หน้า 2

ไทยโพสต์ • โควิดสายพันธุ์อังกฤษระลอก 3 โจมตีรุนแรง หมอโรคปอดห่วงสุขภาพบุรีไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 14 เท่า สิ่งทอหมักควันสูบบุหรี่โรครุนแรงถึงตายได้ ติดโควิดมีโอกาสถึงตาย ชี้น้ำบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มการแพร่กระจายไวรัสเหตุปริมาณปล่อยละอองเยอะ แฉะกันสูบ

วันที่ 29 เมษายน นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มพิทยะ กัด ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้โควิด-19 ที่ระบาดในไทย เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ ที่ติดเชื้อง่ายและมีควมรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อจะลงไปปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวล ขอฝากถึงคนที่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถในการขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่หมักหมมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้มากกว่าคนปกติ สสส.เชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้เลิกสูบเพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันกาติดเชื้อโควิด-19

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ในงานรณรงค์รณรงค์รณรงค์ช่วยชีวิตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อื่น มีงานวิจัยระบุว่า ผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ 5-14 เท่า และเมื่อป่วยแล้วมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปที่ไม่สูบเลยอย่างชัดเจน ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ นักสูบที่สูบบุหรี่เกิดโรคเรื้อรังแล้ว เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งปอด ระบบภูมิคุ้มกันจะมีผลต่ำกว่าคนปกติ ทำให้เชื้อโควิด-19 สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

“บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิดมากกว่าบุหรี่มวน เพราะปริมาณของฝอยละอองปล่อยลอยออกไปในอากาศมีมากกว่าบุหรี่มวน ซึ่งฝอยละอองนี้จะพาเอาเชื้อโควิดไปพร้อมกัน พฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นกลุ่ม พุดคุยกัน แพร่เชื้อให้แก่กันได้ง่ายมาก การแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงมีดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า แคร่บุหรี่

ไฟฟ้าระหว่างกัน เชื้อโควิดแพร่กระจาย ขอให้เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด” รศ.นพ.สุทัศน์กล่าว

นพ.สุทัศน์กล่าวอีกว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความกังวลมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่มวน เนื่องจากสารประกอบต่างๆ ในบุหรี่ไฟฟ้ามีความเป็นพิษสูงกว่า เช่น นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากบุหรี่มวน สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายกว่า มากกว่า และเกิดผลกระทบต่อหลอดเลือดได้มากกว่าแบบเดิม บุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินมากกว่าในบุหรี่มวนถึง 10-100 เท่า นอกจากนี้ สารระเหยในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โพรโพลีนไกลคอล กลีเซอริน ที่ใช้เป็นตัวทำละลายในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น น้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะไม่ใช้สารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในปอด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเยื่อทางเดินหายใจ และเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลันได้ ทั้งนี้ ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 หากประชาชนต้องการคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 โทร.ฟรีทุกเครือข่าย ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนา Line bot เพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่เพิ่มอีกช่องทาง.