



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 หน้า 20 มูลค่าข่าว 283,905.-



เตือน!! เจตนาเกิน “ยาลดความดัน” เกินขนาด เสี่ยงถึงชีวิต

หมอห่ม รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช ได้ออกมาโพสต์เตือนสำหรับผู้ที่เจตนาทานยาลดความดันเกินขนาด อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยาลดความดันมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำเกินไป

เฟซบุ๊ก “วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี” หรือ หมอห่ม รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้

ออกมาโพสต์เตือนภัยจากกินยาลดความดันเกินขนาด อันตรายถึงชีวิต

โดย “หมอห่ม” ระบุข้อความว่า “เจตนาทานยาลดความดันเกินขนาด อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต การทานยาลดความดันเกินขนาด อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากยาลดความดันมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต หากความดันโลหิตต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นช้า หายใจลำบาก

ชัก หมดสติ และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากทานยาเกินขนาด หรืออาจเกิดขึ้นช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ทานเกินขนาด ต่อไปนี้เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการทานยาลดความดันเกินขนาดตามประเภทของยา

1. ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับอาการ ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. ยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blockers) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับอาการหายใจลำบาก หัวใจเต้นช้า หัวใจล้มเหลว สมองขาดเลือด

3. ยากลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium channel blockers) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ หัวใจเต้นช้า สมองขาดเลือด

4. ยากลุ่มแองจิโอเทนซินรีเซปเตอร์บล็อกเกอร์ (angiotensin receptor blockers (ARB)) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับหน้ามืด เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ สมองขาดเลือด

5. ยากลุ่มเอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับหน้ามืด เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ สมองขาดเลือด

การเจตนาทานยาลดความดันเพื่อให้ความดันต่ำ หน้ามืด เพื่อให้มีข้ออ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ” .