



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า มุลค่าข่าว .-

หมอมหุ เดือนวัยรุ่น! กินโปรฯ ปริมาณมากอาจมีอาการชัก อันตรายสูงสุดคืออาจเสียชีวิตได้



“หมอมหุ วีระศักดิ์” ออกมาให้ความรู้เดือนวัยรุ่น! กินโปรฯ เกินขนาดจะทำให้เกิดการกตการทำงาน
ของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการซึม เกิดภาวะความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว และหายใจลำบาก หาก
ทานร่วมกันหลายชนิดในปริมาณมากอาจมีอาการชัก อันตรายสูงสุดคืออาจเสียชีวิตได้

วันนี้ (24 ก.พ.) เพจ “หมอมหุ วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้โพสต์ระบุข้อความว่า " เดือนวัยรุ่น! กินโปรฯ เสี่ยงตย
“กินโปรฯ” ที่เหล่าวัยรุ่นพูดถึงนั้น คือ เครื่องดื่มที่ถูกนำมาผสมกับยาที่มีชื่อว่า “โปรโคดิล” หรือยาที่มีส่วนประกอบ
ของ “โปรเมทาซีน” รวมกันกับเครื่องดื่มและยาชนิดอื่นๆ เช่น ترامาดอล อัลปราโซแลม เพื่อหวังผลให้เกิดความมึน
เมา เคลิบเคลิ้ม คล้ายกับการใช้ยาเสพติด

ยา “โปรโคดิล” (Procodyl Syrup) เป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการแพ้ทั่วไป จัดเป็นยาอันตรายตาม
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 โดยตัวยาสสำคัญที่ประกอบอยู่ในยาโปรโคดิลคือ “โปรเมทาซีน” (Promethazine) ซึ่งออก
ฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ยับยั้งสารฮีสตามีนเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในร่างกาย

โปรเมทาซีน มีฤทธิ์คล้ายยารักษาอาการทางจิตเวช ทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือ ง่วง ซึม เมื่อนำไปผสมกับ
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือยาชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ทำให้ตื่นตัว ทำให้วัยรุ่นที่กินโปรฯ นั้นมีอาการคล้ายกับการดื่มสุรา โดย
อาการที่เกิดขึ้นเมื่อกินโปรฯ เช่น ง่วง มึนงง สลึมสลือ มึนเมา คล้ายอาการกึ่งหลับกึ่งตื่น เหมือนกันกับการเมาสุรา
หรือการใช้ยาเสพติด

การทาน โปรเมทาซีน เกินขนาดจะทำให้เกิดการกตการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิด
อาการซึม เกิดภาวะความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว และหายใจลำบาก



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

กินโปรฯ มักจะผสมโปรโคติลกับยาอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น ทรามาดอล หรืออัลปาโซแลม โดยปกติเพียงแค่รับประทานโปรโคติลเข้าไปก็ส่งผลให้เกิดอาการซึมอยู่แล้ว การผสมกันของสารออกฤทธิ์เหล่านี้ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงต่อร่างกาย หากรับประทานร่วมกันในปริมาณมากอาจมีอาการชัก อันตรายสูงสุดคืออาจเสียชีวิตได้จากระบบหายใจล้มเหลวจากฤทธิ์กดประสาทร่วมกันของยาครับ”